SUR DEUX LEPROCAULUS (COLÉOPTÈRES HÉTÉROMÈRES),

PAR M. PIC.

CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

LEPROCAULUS DIFFORMIS Pic.

Habitat : Tonkin : Chapa, 1200 m. d'alt. (coll. Chatanay, au Muséum National de Paris). Aussi dans ma collection.

Le L. difformis a été décrit en 1922 (Mél. exotico-entom., 37, p. 28), originaire du Laos et placé, à tort, dans le genre Strongylium Kirby. Cette espèce rentre dans le sous-genre Pseudocælophus Pic, caractérisé par le prothorax muni latéralement d'une carène sinuée, coudée postérieurement et flanquée d'un sillon interne.

Leprocaulus particularis nov. sp.

Parum elongatus, piceus, submetallicus, membris rufis; thorace antice fere lævi, postice punctato et plicato, trisulcato; elytris pro parte carinato-tuberculatis, intervallis foveolatis.

Un peu allongé, couleur de poix avec les élytres à reflets métalliques. membres roux. Tête presque lisse, munie, derrière l'épistome, d'un sillon arqué; prothorax un peu plus long que large, rétréci en arrière, presque lisse antérieurement et sur les côtés, seulement finement et éparsément ponctué en dessus, ponctué grossièrement avec quelques plis en arrière et trois sillons, le médian long, les autres courts, côtés du prothorax, en arrière, profondément creusés; élytres plus larges que le prothorax, assez longs, atténués à l'extrêmité, ayant des rangées de fovéoles ou d'impressions internes et des côtes tuberculées avec les intervalles fovéolés; cuisses

très claviformes, tibias antérieurs et intermédiaires peu arqués, postérieurs subsinués. — Long. 12-13 millimètres.

Habitat: Tonkin, Chapa (coll. Chatanay, in Muséum National de Paris).

Espèce très distincte par la sculpture particulière de son prothorax, celui-ci étant presque lisse en avant et sur les côtés, irrégulièrement ponctué et plissé sur la base, avec trois sillons discaux.